

 **Rivorm**<sup>®</sup> *"Doğadan Doğaya"*



# RIVO'S COMBI

Bitkilerinizin çok düşük miktarlarda ihtiyaç duyduğu, ancak noksanlığında gelişimi engelleyen tüm mikro besin elementlerini dengeli bir biçimde içeren ürünümüz İz Element Katkılı Sıvı Organomineral Gübre RIVO'S COMBI, içeriğindeki solucan gübresi kökenli organik madde, mahsulünüzü ve toprağınızı çok yönlü olarak kuvvetlendirecek.



Rivo's Combi İz Elementli Sıvı Organomineral Gübre Kullanım Önerileri			
Kullanım Alanı	Uygulama Zamanı	Yapraktan Uygulama Dozu	Toprakdan Uygulama Dozu
Tahıl Yetiştiriciliği	Kardeşlenme dönemi öncesi bir-iki kez uygulanır.	125-150 cc/100 L su	0,5-1 L/da
Mısır, Ayçiçeği, Kanola Yetiştiriciliği	3-5 yapraklı dönemde uygulanır.	125-150 cc/100 L su	0,5-1 L/da
Pamuk Yetiştiriciliği	3-5 yapraklı dönemde ve tarak başlangıcında olmak üzere iki kez uygulanır. Eksiklik görülmesi durumunda tekrarlanır.	125-150 cc/100 L su	0,5-1 L/da
Şeker Pancarı ve Patates Yetiştiriciliği	5-6 yapraklı dönemde ve 20 gün sonrasında olmak üzere iki kez uygulanır.	125-150 cc/100 L su	0,5-1 L/da
Soğan, Sarımsak, Havuç ve Turp Yetiştiriciliği	Çimlenmeden 20 gün sonra birinci uygulama, ilk uygulamadan 20 gün sonra ikinci uygulama yapılır.	150-200 cc/100 L su	0,5-1 L/da
Domates, Biber, Patlıcan ve Hıyar Yetiştiriciliği	Çiçeklenme öncesinde uygulanır. Eksiklik görülmesi durumunda tekrarlanır.	150-200 cc/100 L su	0,5-1 L/da
Fasulye, Mercimek ve Diğer Baklagiller Yetiştiriciliği	Çiçeklenme öncesinde uygulanır. Eksiklik görülmesi durumunda tekrarlanır.	125-150 cc/100 L su	0,5-1 L/da
Marul, Maydanoz, Roka, Bama, Ispanak, Pırasa, Brokoli, Lahana, Karnabahar ve Kereviz Yetiştiriciliği	3-5 yapraklı dönemde ve baş oluşumunda olmak üzere iki kez uygulanır.	125-150 cc/100 L su	0,5-1 L/da
Kavun ve Karpuz Yetiştiriciliği	Çiçeklenme öncesinde uygulanır. Eksiklik görülmesi durumunda tekrarlanır.	125-150 cc/100 L su	0,5-1 L/da
Meyve Yetiştiriciliği	Çiçeklenme öncesinde uygulanır. Eksiklik görülmesi durumunda tekrarlanır.	150-200 cc/100 L su	0,5-1 L/da
Çiçek Yetiştiriciliği	Dikim sonrası ve çiçeklenme öncesi olmak üzere iki kez uygulanır. Eksiklik görülmesi durumunda tekrarlanır.	150-200 cc/100 L su	0,5-1 L/da
Bağcılık	Salkım uzatmada ve çiçeklenme öncesi olmak üzere iki kez uygulanır.	125-150 cc/100 L su	0,5-1 L/da

Rivo's Combi İçerik Tablosu	
Garanti Edilen İçerik	w/w
Organik Madde	%15
Suda Çözünür Bor (B)	%0,5
Suda Çözünür Bakır (Cu)	%0,4
Suda Çözünür Demir (Fe)	%1
Suda Çözünür Manganez (Mn)	%0,5
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%0,5
Maksimum Klor (Cl)	%1
EC	18,9 dS/m
pH	4-6

Yukarıda ki oranlar standart değildir arazi ve bölgeye göre oralar değişebilir orana bağlı olarak da dekar maliyeti değişir. Ayrıca yapılan hesaplamalar tek uygulama ve 1 dekar baz alınarak hesaplanmıştır.



KOMPOST VERMİKOMPOST TARIM HAYVANCILIK MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

[www.riverm.com.tr](http://www.riverm.com.tr)

Nusratlı Mahallesi, 5011. Sokak, N: 12,  
Süleymanpaşa, Tekirdağ 59030, Türkiye  
+90 [282] 229 20 70  
+90 [532] 473 61 89

[info@riverm.com.tr](mailto:info@riverm.com.tr) · [www.riverm.com.tr](http://www.riverm.com.tr)

