



**ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE
BİR SEZONDA GÜBRELERİMİZİN
UYGULAMA ZAMANLARI**

Yapılan toprak analizine göre deęişim gösterebilir.

1



Çilek toprakla buluşduktan 10 gün sonra damlamadan 1000m²'ye 2,5L Rivo Sıvı Solucan Gübresi + 1,5L Rivo's Soil Power [NP] karıştırılarak uygulanması tavsiyemizdir. Bu uygulama çileğin gelişimi takip edilerek ilk çiçek görülünceye kadar haftada 3 kez tekrarlanabilir.

2



Çileğin gelişme durumuna bakılarak, dikimden 30 gün sonra hasat sonuna kadar iz elementi ihtiyaç durumuna göre ayda bir kere 100L suya 250cc Rivo's Combi takviyesi yapılması tavsiyemizdir.



3



Dikimden sonra verim ve meyve kalitesinin artışı sağlamak için her 30 günde bir kere 1000m²'ye 1,5L Rivonardit Sıvı uygulaması tavsiyemizdir.

4



Meyve tutumundan itibaren, hasat sonuna kadar azot, fosfor ve potasyum ihtiyacını karşılayabilmek için damlamadan en az haftada üç kere 2,5L Rivo's NPK yapılması tavsiyemizdir. Bitkinin gelişim durumuna bakılarak, hızlı etki alabilmek için gelişim periyodu boyunca 100L suya 350cc Rivo's NPK'nın yapraktan uygulanması tavsiyemizdir.

5



Bitkinin kök gelişimini teşvik etmek için gerekirse 20 gün, gerekse 30 günde bir defa damlamadan 1,5L Rivo's Humik Asit uygulanabilir.